



HUMMER

Reg. PQUA N° 563 – SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

HUMMER es un insecticida altamente sistémico actúa por contacto e ingestión.

FORMULACIÓN

HUMMER es un insecticida formulado como Gránulos Dispersables (WG), contiene 250 gramos de thiamethoxam por cada kilogramo de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Neonicotinoide

MODO DE ACCIÓN

El thiamethoxam interfiere con los receptores acetilcolina nicotínicos, causando convulsiones nerviosas, lo que provoca parálisis y muerte del insecto.



HUMMER

CUADRO DE USOS

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Aplicaciones al follaje

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/200L	Kg/ha		
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	75	0.225	7	0.2
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	80	0.4	21	0.5

Aplicaciones al suelo tipo “drench” y al sistema de riego por goteo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	MÉTODO	P.C.* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Arándano	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	2	En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar posteriormente.	75	0.3
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	1.5	Regar antes y después de realizar la aplicación.	28	0.5

PC: Período de carencia *Última aplicación antes de la cosecha

**Limite máximo de residuos (ppm)

RECOMENDACIONES

- Aplicar al inicio del ataque de la plaga.
- No aplicar en floración, por ser tóxico a abejas.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- No aplicar contra el viento.
- Durante la aplicación usare equipo de protección.



HUMMER

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- No aplicar en época de floración
- El momento para raizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo
- Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.
- Para cultivo de palto se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año durante la etapa vegetativa.

COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidad con otros insecticidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado a la dosis recomendada.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las zonas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.



HUMMER

SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- No permita el ingreso de animales domésticos a zonas tratadas.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.