

PRAVILO

PQUA Nº 3745 - SENASA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRAVILO tiene acción protectora y curativa. Es un fungicida que contiene dos ingredientes activos en su formulación que actúan de manera complementaria.

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

Cada litro del formulado contiene 125 g/L Fluopyram y 375 g/L Pyrimethanil

GRUPO QUÍMICO

Fluopyram: Anilopirimidina

Pyrimethanil: Pyridylethylamide

MODO DE ACCIÓN:

Fluopyram, traslaminar y de acción sistémica a través del xilema. Inhibe la respiración mitocondrial bloqueando el transporte de electrones en la cadena respiratoria a nivel del succinato deshidrogenasa. **Pyrimethanil** actúa por contacto, con acción sistémica local y translaminar. Inhibe la biosíntesis de metionina, esencial para el desarrollo del patógeno. Impide la secreción de proteínas involucradas en el proceso de penetración y necrosis de la planta; y afecta la germinación de esporas y el desarrollo inicial del micelio.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.15	14	0.6 ⁽¹⁾ 7 ⁽²⁾

(1) Fluopyram (2) Pyrimethanil

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

Fecha de última actualización: 07/03/2025

Página 1 de 2

PRAVILO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda iniciar las aplicaciones de **PRAVILO** al observar los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo. Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

PRAVILO es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de la mezcla del producto **PRAVILO** llene el cilindro de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. **PRAVILO** se aplica empleando equipos de aspersión manual, a motor o montados sobre el tractor.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.