**Reg. PQUA N° 1012 – SENASA**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**YUNKE** es un insecticida sistémico y residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto. Está recomendado para el control de gorgojo de los andes. Es activo sobre insectos resistentes a los carbamatos, ciclodieno y piretroides.

## FORMULACIÓN

**YUNKE** es un insecticida formulado como Suspensión Concentrada (SC), que contiene 157 g de Fipronil y 100 g de Imidacloprid por L de producto formulado.

## GRUPO QUÍMICO

Fipronil: Fenylpirazol

Imidacloprid: Neonicotinoides

## MODO DE ACCIÓN

**YUNKE** Combina la acción de dos ingredientes activos:

Fipronil; bloquea los receptores GABA (ácido gama amino butírico), como consecuencia altera la permeabilidad del ion cloro. Produce la muerte del insecto por convulsión.



Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

Imidacloprid actúa al nivel del sistema nervioso central bloqueando irreversiblemente los receptores nicotínicos de las neuronas, lo que produce la muerte por cansancio muscular.

## CUADRO DE USOS

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (ml/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Papa | Gorgojo de los andes | *Premnotrypes vorax* | 250 | 21 | 0.01(1) 0.5(2) |
| Café | Broca | *Hypothenemus hampei* | 250 | 94 | 0.005(1) 1.0(2) |

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
**(1) Fipronil.**
**(2) Imidacloprid.**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar máximo 1 aplicación por campaña/año, cuando se observen los primeros adultos de la plaga en el cultivo. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para completar su manejo de la resistencia.

## PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada debe ser después de 48 horas de la aplicación.



Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe

## COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con la mayoría de productos insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. Realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes.

## RECOMENDACIONES

- Dar buena cobertura de aplicación.
- Aplicar cuando se observen los primeros adultos de la plaga.
- Rote con otros insecticidas de diferente modo de acción.

## SEGURIDAD

- NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- Es moderadamente peligroso – dañino por lo que tiene banda de seguridad color amarillo.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de seguridad personal.

## ENVASES

Botellas de 0.25L, 0.50 L y 1 L.



Calle Sucre 270
Ate / Lima / Perú
Telf.: (01) 748-2717
ventas@hortus.com.pe / www.hortus.com.pe